



Ce document, élaboré par la DGSCGC, a une vocation informative et ne se substitue pas aux références techniques nationales officielles en vigueur. Destiné à accompagner les formateurs, il recense les ajouts, reformulations, suppressions et corrections apportés aux textes de référence.

À noter : La version présentée a fait l'objet de nombreuses corrections (orthographiques, syntaxiques ou de forme), non détaillées dans ces tableaux. L'ensemble des modifications apportées au PSC ont été retranscrites dans le PSE dans un but d'uniformisation.

État des fiches

Fiches ajoutées

Nom 2026	Code 2026	Justification
La bouteille d'oxygène	05AC01	Au même titre que le DAE, l'oxygène est utilisé tout au long des références techniques nationales, il a donc été fait le choix de les extraire et d'en faire une fiche à part entière.
Perte de connaissance en équipe	05PR06	Urgences vitales.
Massage utérin	08FT02	Atteintes circonstancielles et environnementales.
Techniques de refroidissement d'une victime	08FT03	Au même titre qu'il y a une fiche technique pour le réchauffement, une fiche sur le refroidissement a été générée. Cela permet de simplifier les fiches procédures.
Alerte	12AC02	Le PSE1 valant équivalence du PSC, l'intégralité des gestes du PSC doit y être enseignée et maîtrisée, d'autant plus que le secouriste peut être amené à les appliquer seul lors d'interventions en qualité de sauveteur isolé, ou avant l'arrivée de son équipe.
Alerte et protection des populations	12AC03	
Obligations pour les formations	13AC01	Ajout d'un chapitre complet concernant les obligations pour les entités habilités à former.

Fiches supprimées

Nom 2023	Type	Justification et devenir
Mise en place de gants stériles	Fiche technique	L'utilisation des gants stériles par les secouristes, sur le terrain, est très rare. D'autant qu'aucune procédure dans les références techniques nationales ne faisait appel à ces derniers en dehors du retrait de gants.
Arrêt cardiaque chez l'enfant ou le nourrisson	Procédure	Procédure unique démarrant pour tous par le massage cardiaque. Fusionnée dans les nouvelles procédures « Arrêt cardiaque en équipe / en sauveteur isolé ».
Arrêt cardiaque chez l'enfant ou le nourrisson en sauveteur isolé		
Obstruction partielle des voies aériennes	Procédure	Fusionnées dans « Obstruction des voies aériennes » dans une seule et même procédure correspondant au logigramme de l'ERC.
Obstruction complète des voies aériennes		

Fiches renommées

2023	2026	Justification
Recherche des lésions	Recherche de lésions	Correction.
Utilisation d'une bouteille d'oxygène	La bouteille d'oxygène	Changement d'état (FT vers AC) car cette fiche est appelée par de nombreuses autres. Cela permet d'alléger la fiche dans laquelle elle se trouvait précédemment.
Hémorragie externe	Hémorragies externes	Correction.
Obstruction des voies aériennes par un corps étranger	Obstruction des voies aériennes	Intégration dans la définition de la notion de corps étranger.
Désobstruction par la méthode des claques dans le dos	Désobstruction par des claques dans le dos	Uniformisation avec d'autres fiches.
Désobstruction par la méthode des compressions abdominales	Désobstruction par des compressions abdominales	

Désobstruction par la méthode des compressions thoraciques	Désobstruction par des compressions thoraciques	
Arrêt cardiaque chez l'adulte	Arrêt cardiaque en équipe	Fusion des fiches adultes, enfant et nourrisson en une seule : en équipe
Arrêt cardiaque chez l'adulte en sauveteur isolé	Arrêt cardiaque en sauveteur isolé	Fusion des fiches adultes, enfant et nourrisson en une seule : isolé
Section de membre	Amputation ou arrachement complet d'une partie du corps	Élargissement aux tissus mous
Utilisation d'un lot membre arraché ou sectionné	Conditionner une partie du corps amputée ou arrachée	Centrer sur l'action et pas uniquement sur l'utilisation d'un matériel.
Prendre en charge une affection liée à la chaleur	Affections liées à la chaleur	Refonte de la fiche pour s'adapter aux épisodes climatiques de demain et permettre un alignement avec les recommandations de l'ILCOR et de l'ERC.

Justifications

Fiche	Type	Avant	Après	Justification
Sommaire et contenus de formation	Ajout		Ces dernières sont classées selon la logique de rechercher et traiter en priorité « ce qui tue en premier ».	Cela permet de prioriser et organiser les actions face à une situation, selon l'urgence.
Le citoyen de Sécurité Civile	Reformulation Actualisation	https://www.gouvernement.fr/risques/s-engager-pour-aider-en-cas-de-crise	[...] https://www.securite-civile.interieur.gouv.fr/sengager	Reformulation en lien avec les arrêtés ou la philosophie recherchée. Adaptation du lien à la suite de la publication du site de la DGSCGC
Sécurité sur intervention particulière	Modification	Pour faire face à ce risque, il convient de : [...]	• faire évacuer les personnes présentes dans le local et les rassembler ; • alerter immédiatement les sapeurs-pompiers qui ont des détecteurs de ce gaz ;	Rester dans la pièce sans aucune protection que ce soit pour essayer d'aérer ou de trouver la source, expose le secouriste à un risque important. A cet égard, il a été décidé de donner priorité à la sécurité.

			• attendre les secours en sécurité.	
Sécurité sur intervention particulière	Modification	Protection contre l'incendie [...]	appliquer les consignes sapeurs-pompiers, notamment concernant l'évacuation des occupants ou leur confinement ;	La priorité doit être l'alerte, les sapeurs-pompiers orienteront la conduite à tenir des secouristes au regard de la situation en donnant des consignes contextualisées notamment en ce qui concerne le confinement ou l'évacuation des occupants.
Utilisation des emballages à élimination de déchets	Modification	les déchets mous : compresses, pansements, champs, draps à usage unique...	fortement imprégné de sang, de sécrétions ou d'excrétions avec risque d'écoulement : compresses, pansements, champs, draps à usage unique...	Au regard de l'évolution des pratiques, la définition de ce qu'est un déchet d'activité de soins avait nécessité d'être harmonisée, notamment en lien avec la santé. Il a donc été fait le choix de reprendre la définition employée par l'Haute Autorité de Santé qui souligne le fait qu'il doit être « fortement imprégné de sang », le reste étant évacué avec les Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères (DAOM).
Deuxième regard	Ajout	[...]	La conscience de la victime en lui demandant comment elle va, d'ouvrir les yeux ou de serrer les mains. [...] en la retournant si nécessaire, [...] Note de bas de page	Le retournement était induit dans les fiches urgences vitales, son ajout explicite permet de situer « quand » réaliser un retournement d'urgence à 1 ou à 2. Il est également fait rappel que le terme « rechercher » employé dans l'évaluation des fonctions vitales, correspond au 2^{ème} regard.
Troisième regard	Ajout	[...]	[...] Note de bas de page	Il est fait rappel que le terme « apprécier » employé dans l'évaluation des fonctions vitales, correspond au 3^{ème} regard. Cela vise à remettre l'accent sur l'appréciation avec ses sens pour déceler des signaux évidents de détresse (observation, écoute, prise de pouls sur 15sec, etc).
Quatrième regard	Ajout	[...]	[...] Note de bas de page	Il est fait rappel que le terme « mesurer » employé dans l'évaluation des fonctions vitales, correspond au 4 ^{ème} regard.
Surveillance	Ajout	[...]	[...] prendre en compte et surveiller la sensation de froid ou de chaud [...]	Au regard de l'actualité et des situations pouvant engendrer des hypothermies, ou des hyperthermies, il est nécessaire de surveiller l'évolution de la sensation de froid ou de chaud de la victime.

Fiches techniques	Ordre	[...]	[...]	Les fiches techniques ont été regroupées par thématique pour faciliter la navigation dans le document. Il n'a pas été fait le choix comme en PSC de mettre les fiches techniques à l'issue de chaque conduite à tenir car les appels sont réalisés tout au long du document.
Tout le document	Alignement	Ventilation	Respiration	Bien que médicalement différent, il a été fait le choix d'utiliser un terme unique tout au long des références techniques nationales afin de simplifier le discours.
Mesure de la saturation pulsée en oxygène	Ajout	Dans plusieurs situations, le signal peut ne pas être détecté par le capteur (victime agitée, tremblements, refroidissement des extrémités, détresse circulatoire, maladies vasculaires, etc.) et ne donnera pas de résultat fiable.	Dans plusieurs situations, le signal peut ne pas être détecté par le capteur (victime agitée, tremblements, refroidissement des extrémités, détresse circulatoire, maladies vasculaires, pigmentation de la peau, etc.) et ne donnera pas de résultat fiable.	Les études ont mis en évidence des disparités dans les mesures du fait de la pigmentation de la peau. Cela doit donc être un point de vigilance pour les équipes qui doivent se référer au contexte et aux signes en cas de problème avec la mesure.
Evaluation de la fonction neurologique	Précision Reformulation	Non-LED	lampe d'examen oculaire	Il convient de lire la notice des lampes employées et de suivre les recommandations du fabricant.
Mesure de la glycémie capillaire	Correction	Les secouristes utiliseront le lecteur choisi par leur autorité médicale d'emploi. Certains appareils de glycémie nécessitent une calibration préalable. Pour cela, il faut se référer au manuel d'utilisation de l'appareil.	Certains appareils de glycémie nécessitent une calibration préalable. Pour cela, il faut se référer au manuel d'utilisation de l'appareil.	Correction d'une incohérence qui dans une fiche disait qu'il fallait utiliser l'appareil de l'autorité d'emploi et dans une autre, celui de la victime.
Mesure de la température	Ajout	Néant	hypothermique. Il est spécifiquement conçu pour mesurer des températures corporelles très basses, en dessous de la normale (36,5–37,5 °C).	Un thermomètre traditionnel a une marge d'erreur et une plage d'utilisation pour sa mesure. L'ajout de ce matériel vise à démontrer les limites de certains thermomètres, permettant de souligner l'importance pour le secouriste de s'appuyer sur le contexte et les signes appréciés.

			Il peut mesurer des températures à partir de 25 °C ou moins, ce qui permet de détecter et suivre une hypothermie sévère, ce qu'un thermomètre ordinaire ne permet pas de faire.	
La bouteille d'oxygène	Ajout	Néant	Fiche	L'ajout de cette fiche est réalisé dans la même logique que celle du DAE. Elle permet d'alléger la fiche dans laquelle elle se trouvait précédemment, ainsi que d'être plus facilement appelée par les autres fiches.
Retrait des gants à usage unique	Simplification	des gants stériles ou non stériles à usage unique :	des gants à usage unique :	Qu'ils soient stériles ou non, cela reste des gants à usage unique. De plus, les gants stériles ont été retirés.
Hémorragies externes	Reformulation Mise en forme	Définition[...] Causes [...] Conduite à tenir [...]	Définition[...] Causes [...] Conduite à tenir [...]	Harmonisation avec les références techniques nationales PSC et mise en évidence de la nécessité de réchauffer.
Hémorragies extériorisées	Reformulation	Par le nez [...]	Par le nez [...]	Harmonisation avec les références techniques nationales PSC.
Pansement compressif	Ajout	[...]	suivre les instructions du fabricant, généralement [...] Pansement compressif improvisé	Au regard des multiples matériels existants, avec des mises en œuvre pouvant être différentes, l'accent est mis sur les instructions constructeurs si elles existent. Une équipe peut également se retrouver dans certaines situations à court de matériel aussi doit-elle être en mesure de faire avec des moyens improvisés. De plus au regard des arrêtés, le PSE1 donne équivalence au PSC, ce qui nécessite que les éléments du PSC soient intégrés.
Garrot	Reformulation Simplification	Il est nécessaire dans tous les cas de se référer aux préconisations du fabricant.	• suivre les instructions du fabricant.	Compte tenu de la multiplicité des garrots de fabrication industrielle, le système décrit, bien que majoritaire, ne permet pas de couvrir l'intégralité des garrots en circulation.

		Toutefois, ces garrots utilisent en majorité le même principe de pose : • glisser la sangle du garrot autour du membre ; • fixer la sangle en la passant dans la boucle prévue à cet effet afin que le garrot entoure le membre ; • actionner le dispositif de serrage jusqu'à l'obtention de l'arrêt du saignement ; • bloquer le dispositif de serrage pour que le garrot ne lâche pas brutalement et veiller à ce qu'il soit positionné à l'extérieur du membre pour ne pas occasionner de blessures au moment du brancardage ; [...] S'il est disponible, il est préférable d'utiliser un garrot de fabrication industrielle, spécialement conçu à cet effet.		A cet égard, se référer à la notice des garrots de fabrication industrielle de l'entité, est plus judicieux.
Garrot	Reformulation	section de membre	amputation ou arrachement d'une partie du corps	Par cohérence, harmonisation des terminologies au regard des changements de l'ancienne fiche « section de membre ».
Obstruction des voies aériennes	Reformulation Simplification	Intégralité de la fiche apport de connaissance Définition, risques et conséquences, signes, principe de l'action de secours	Intégralité de la fiche apport de connaissance Définition, risques et conséquences, signes, principe de l'action de secours	Suppression de la notion de partielle et de complète pour être en accord avec les formulations internationales.
Obstruction des voies aériennes	Reformulation	Intégralité de la fiche conduite à tenir	Intégralité de la fiche conduite à tenir	Harmonisation avec les références techniques nationales PSC. Alignement sur les recommandations internationales, basées sur les signes et leurs évolutions au cours de l'intervention.

Arrêt cardiaque	Simplification	Une personne est en arrêt cardiaque (AC) lorsque son cœur ne fonctionne plus ou fonctionne de façon anarchique, ne permettant plus d'assurer la circulation du sang dans l'organisme et en particulier l'oxygénation du cerveau.	Une personne est en arrêt cardiaque lorsque son cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique, ne permettant plus d'assurer l'oxygénation du cerveau.	Harmonisation avec les références techniques nationales PSC.
Arrêt cardiaque	Reformulation Simplification	Fiche conduite à tenir adulte Fiche conduite à tenir enfant nourrisson Fiche conduite à tenir adulte en isolé Fiche conduite à tenir enfant nourrisson en isolé	Fiche conduite à tenir en équipe Fiche conduite à tenir en isolé	Simplification du message par une procédure unique pour tous, sur une seule fiche. Harmonisation avec les références techniques nationales PSC pour le sauveteur isolé.
Arrêt cardiaque	Suppression	5 insufflations initiales chez l'enfant, le nourrisson, et le noyé	Néant	Suppression des 5 insufflations initiales dans un but de simplification du message par une procédure unique pour tous.
Arrêt cardiaque	Ajout	Néant	Lorsqu'un témoin a réalisé une réanimation avant l'arrivée des secours, l'équipe prend le relais de ce dernier. Avoir pratiqué ces gestes, souvent sur un proche, peut être psychologiquement difficile à vivre pour le témoin. Sans retarder l'action de secours et dans la mesure du possible, un membre de l'équipe doit donc prendre un moment pour évaluer son état émotionnel, le rassurer sur la qualité de son intervention et valoriser son action.	Le but est ici de mettre en évidence la nécessité pour une équipe constituée d'agir pour la victime mais également de penser à l'impact psychologique sur les primo intervenants, notamment dans le cadre des déclenchements de plus en plus fréquents par les applications citoyennes.

Arrêt cardiaque en équipe	Ajout	Néant	Dans le but de garantir l'efficacité des manœuvres, un de ces intervenants formés peut assurer le rôle de « coach » en guidant, encourageant et corrigeant les gestes effectués par les autres.	Le coaching RCP contribue à augmenter la qualité de la prise en charge dans le temps, mais également à l'accompagnement psychologique des intervenants, ainsi qu'un apprentissage en situation.
Arrêt cardiaque en sauveteur isolé	Modification Simplification	En période d'épidémie [...]	En période d'épidémie [...]	Ajustement de l'ordre pour proposer une conduite à tenir chronologique en ce qui concerne la protection de l'intervenant
Perte de connaissance en équipe	Reformulation Simplification	Fiche entière	Fiche entière	Simplification du message en enlevant toutes les redondances liées au bilan, et en harmonisant avec la fiche secouriste isolé.
Perte de connaissance en sauveteur isolé	Reformulation	Fiche entière	Fiche entière	Simplification du message en enlevant toutes les redondances liées au bilan, et en harmonisant avec la fiche en équipe, et en harmonisant avec les références techniques nationales PSC.
Détresse circulatoire	Correction	au bilan circonstanciel ou au bilan complémentaire.	au 1er regard ou au 4ème regard.	Correction d'une coquille datant de la réforme du bilan.
Désobstruction par des claques dans le dos	Reformulation	Indication [...] les deux omoplates	Indication [...] les omoplates	Par cohérence, avec la suppression des termes « partielle » et « complète ». Harmonisation des termes quel que soit le type de victime.
Désobstruction par des compressions thoraciques	Modification	placer la pulpe de deux doigts d'une main dans l'axe du sternum, une largeur de doigt au-dessus d'un repère constitué par le bas du sternum à la jonction des dernières côtes. Cette position est la même	- comme pour les compressions thoraciques pour un arrêt cardiaque : - o entourer le thorax du nourrisson avec les mains ; - o placer deux pouces, l'un sur l'autre, au milieu du sternum. - effectuer de 1 à 5 compressions successives, en relâchant complètement entre chacune. La profondeur de	La technique avec les deux pouces et l'encerclement du thorax a démontré une meilleure efficacité. La technique des deux pouces est donc la seule retenue conformément aux recommandations internationales.

			compression est au-delà d'un tiers de la hauteur du thorax.	
Compressions thoraciques	Simplification	placer, sur le sternum, un travers de doigt au-dessus d'un repère constitué par le bas du sternum à la jonction des dernières côtes ¹ : le talon d'une main ;	placer le talon d'une main au centre de la poitrine, sur la moitié inférieure du sternum ;	Uniformisation de la zone de compression pour toutes les victimes dans le but de simplifier le message et ainsi augmenter la qualité de la prise en charge.
Compressions thoraciques	Modification	Indication	entourer le thorax du nourrisson avec les mains ; placer la pulpe des deux pouces placés l'un sur l'autre, sur la moitié inférieure du sternum ;	La technique avec les deux pouces et l'encerclement du thorax a démontré une meilleure efficacité. La technique des deux pouces est donc la seule retenue conformément aux recommandations internationales.
Utilisation d'un défibrillateur automatisé externe	Correction	[...]	• continuer la réanimation cardio-pulmonaire pendant la pose des électrodes ;	Déplacement d'un élément qui était présent dans la conduite à tenir, mais qui relève de la mise en œuvre du défibrillateur.
Utilisation d'un défibrillateur automatisé externe	Ajout	[...]	Position des électrodes [...]	Les recommandations médicales internationales indiquent la possibilité, pour les équipes médicales, de réaliser une double défibrillation. Compte tenu du fait que les équipiers peuvent être confrontées à une demande du médecin, connaître son existence et la position des électrodes peut permettre de gagner en efficacité lors de la prise en charge.
Utilisation d'un défibrillateur automatisé externe	Ajout	[...]	• si la victime est une femme portant un soutien-gorge, ce dernier peut-être juste déplacé pour placer les électrodes ;	Absence de preuve justifiant un retrait obligatoire dans tous les cas (littérature quasi inexistante sur le sujet). Priorité absolue au temps : chaque minute de retard dans la défibrillation réduit les chances de survie, donc on évite toute manipulation non indispensable. Objectif d'équité de genre : simplifier le geste (déplacer plutôt que dévêtir) réduit l'hésitation des témoins face à une victime

				portant un soutien-gorge, connue pour retarder la prise en charge par gêne ou crainte sociale.
Détresse respiratoire, circulatoire, neurologique	Reformulation	Fiches	Fiches	Simplification du message.
Malaise et aggravation de maladie	Reformulation	Fiche	Fiche	Harmonisation avec les références techniques nationales PSC.
Aide à la prise de médicaments	Ajout Reformulation	Fiche	Fiche	Compte tenu de la multiplicité des matériels, appliquer les recommandations du fabricant, et à défaut appliquer la procédure des références techniques nationales.
Crise d'asthme	Reformulation	Causes [...] Signes [...]	Causes [...] Signes [...]	Pour réduire la fiche à une seule page.
Malaise hypoglycémique chez le diabétique	Correction	[...] en utilisant un appareil de mesure de la glycémie capillaire, le glucomètre. On utilisera de préférence l'appareil de mesure de la victime, sinon l'équipe de secours utilisera le sien si elle en est dotée	[...] en utilisant un appareil de mesure de la glycémie capillaire, le glucomètre.	Correction d'une incohérence qui dans une fiche disait qu'il fallait utiliser l'appareil de l'autorité d'emploi et dans une autre, celui de la victime.
Réaction allergique grave	Modification	En l'absence d'amélioration ou en cas de récurrence dans les 10 à 15 minutes qui suivent la première injection, une deuxième injection à l'aide de l'auto-injecteur peut être réalisée. Si possible, demander un nouvel avis au médecin régulateur.	En l'absence d'amélioration ou en cas de récurrence dans les 5 minutes qui suivent la première injection, une deuxième injection à l'aide de l'auto-injecteur peut être réalisée. Si possible, demander un nouvel avis au médecin régulateur.	Le chiffre des 5 minutes vient directement du CoSTR (Consensus on Science with Treatment Recommendations) de l'ILCOR. Cette fenêtre de 5 minutes correspond au délai jugé nécessaire pour évaluer l'effet clinique d'une injection IM avant de considérer qu'elle est insuffisante.
Brûlures	Reformulation	Fiche	Fiche	Harmonisation avec les références techniques nationales PSC.
Brûlures	Ajout	Néant	Les jeunes enfants présentant des brûlures thermiques et bénéficiant d'un	Le risque d'hypothermie par suite de refroidissement est très important chez les jeunes enfants. Une vigilance accrue est donc requise.

			refroidissement actif à l'eau courante doivent être surveillés pour détecter tout signe et/ou symptôme de refroidissement excessif du corps.	
Plaies	Reformulation	Plaie simple [...]	Plaie simple [...]	Harmonisation avec les références techniques nationales du PSC. Comme pour le malaise, création d'une procédure chapeau, pour ne mettre en relief que les adaptations.
Pour tous les traumatismes de types plaies	Simplification Reformulation		appliquer la conduite à tenir devant une victime qui présente une plaie grave; adapter la conduite à tenir avec : [...]	Simplification des fiches pour ne mettre en évidence que les points de procédure différents ou complémentaires.
Traumatisme des membres	Simplification Reformulation	Fiches	Fiches	Simplification de tous les textes en doublon.
Immobilisation d'un membre inférieur au moyen d'une attelle à traction	Modification	PSE2	Néant	Cette fiche était obligatoire, toutefois, l'utilisation réelle par les secouristes était réduite. Quelques services l'utilisent fréquemment, aussi a-t-il été décidé de la rendre optionnelle.
Traumatisme du dos et du cou	Simplification Reformulation	Fiches	Fiches	Les définitions étaient existantes, mais placées dans la conduite à tenir alors qu'il s'agit d'un apport de connaissance.
Amputation et arrachement complet d'une partie du corps	Modification	Fiche	Fiche	Alignement avec la fiche apport de connaissance. Extension de la fiche « section de membres » aux « tissus mous. »
Conditionner une partie du corps	Modification	Fiche	Fiche	Alignement avec la fiche apport de connaissance. Extension de la fiche aux tissus mous.

Positions d'attente et de transport	Conditionner une partie du corps amputée ou arrachée	Position cuisses fléchies	Position jambes fléchies	Anatomiquement non réalisable. La nouvelle formulation est représentative de l'action.
Aide à la prise de médicaments	Ajout	Fiche	Fiche	Ajout et reformulation de précautions avant l'aide à la prise de médicament
Accouchement inopiné	Reformulation	Fiche	Fiche	Suite à des questions, reformulation des certains aspects techniques
Accouchement inopiné	Reformulation Ajout	[...]	[...] réaliser un massage utérin pour prévenir les hémorragies après la naissance ; [...] Cas particulier : si le placenta ne sort pas au bout de 30 minutes après la naissance, réaliser un massage utérin pour prévenir une hémorragie.	L'atonie utérine est la cause la plus fréquente d'Hémorragie Post-Partum (HPP) . Après l'accouchement, l'utérus doit se contracter pour comprimer les vaisseaux spiralés du site placentaire ; s'il reste flasque, le saignement continue. Le massage du fond utérin (stimulation mécanique directe) déclenche la contraction du myomètre, ce qui comprime ces vaisseaux et réduit le saignement — un mécanisme réflexe simple, ne nécessitant aucun matériel, réalisable immédiatement par n'importe quel intervenant formé. C'est un geste de première ligne car rapide, sans délai d'attente contrairement à l'administration médicamenteuse (utérotoniques), ce qui est cohérent avec le principe général de minimiser tout retard face à une hémorragie potentiellement fatale.
Massage utérin	Ajout	Fiche	Fiche	
Affections liées à la chaleur	Reformulation Correction	Fiche	Fiche	Ce sujet a reçu un rang de priorité élevé de la part du groupe de travail First Aid de l'ILCOR, dans un contexte où une grande partie du monde est exposée à des vagues de chaleur extrême, appelées à devenir plus fréquentes.
Prendre en charge une affection liée à la chaleur	Reformulation Correction	Fiche	Fiche	Au même titre que la fiche réchauffement avait été introduite dans les références techniques nationales, la fiche refroidissement permet de séparer les techniques de la conduite à tenir.

Technique de refroidissement d'une victime	Ajout	Fiche	Fiche	Syncope de chaleur et épuisement par la chaleur (formes modérées, sans atteinte neurologique) : un retrait rapide vers un lieu frais, un refroidissement externe simple et l'apport de liquides sont suffisants. Coup de chaleur (forme grave, avec atteinte neurologique) : il faut prioriser les méthodes de refroidissement actif permettant une vitesse de refroidissement la plus rapide, comme l'application de glace et l'immersion en eau froide.
Intoxications	Ajout	[...]	O si la victime est en arrêt cardiaque, pratiquer l'administration de naloxone après avoir débuté la réanimation.	L'administration ne doit jamais retarder les gestes de réanimation.
Noyade	Suppression	5 insufflations initiales	[...]	Suppression des 5 insufflations initiales dans un but de simplification du message par une procédure unique pour tous. Aucune étude n'a démontré l'utilité de ces 5 insufflations initiales qui ralentissent l'action de secours prioritaire : le massage cardiaque.
Piqûres et morsures	Modification	Méduses [...] Tiques [...]	Méduses [...] Tiques [...]	Reformulation selon les recommandations internationales et selon des aspects pratiques (exemple : sable plutôt que mousse à raser).
Relevage d'une victime en position particulière	Modification	Victime en position latérale de sécurité	Victime en position latérale de sécurité Cette technique est réalisée à quatre secouristes selon une méthode en pont. Si la victime n'est pas traumatisée, il est possible d'adapter la technique à 3 secouristes toujours selon une méthode en pont.	Auparavant, la technique devait obligatoirement être exécutée à 4, ce qui n'est pas toujours justifié en fonction du contexte et de la victime. L'adaptation est désormais possible.

Relevage à trois secouristes	Suppression	Transfert par la technique dite de la « cuillère »		Comme indiqué cette technique, difficile à réaliser, est facilitée par l'utilisation d'un portoir souple. Peu employée, elle a été remplacée par des moyens plus ergonomiques (drap, planche roulante, drap de glisse, déplacement latéral par glissé déposé, etc) permettant d'économiser le dos des intervenants.
Préparation d'un dispositif de portage	Ajout	Néant	La face ou la couleur de la couverture de survie n'ont que peu d'incidence sur la déperdition de chaleur.	On pourrait croire qu'il y a un côté à privilégier plutôt qu'un autre, ce qui n'est pas réellement le cas à l'échelle temporelle d'une intervention. La couverture de survie est un film de polyéthylène téréphtalate métallisé (aluminium vaporisé sous vide), l'argenté étant l'aluminium nu et le doré un simple vernis coloré déposé par-dessus. Une étude a chiffré les propriétés des deux côtés (<i>Prehospital Use of Ultrathin Reflective Foils</i> de Sylwierz Kosiński, 2022). Cette dernière conclut que : - la face n'a pas d'importance pour la protection de la victime ; - une couverture de survie est surtout efficace comme barrière contre le vent et l'eau ; - son efficacité augmente lorsqu'elle est utilisée avec des couches d'isolant emprisonnant de l'air (vêtements, couvertures, duvet), plutôt que seule.